

A Weborvos támogatója: FoodDetective™

(http://ad.adverticum.net

/b/cl,1,1676723,1676719,1676717/click.prm)

Öngyilkosságot fontolgató sebészek

A sebészek kiégése, depressziója, műhibái saját magukra is veszélyt jelenthetnek.



Műhibák, kiégés és depresszió áll annak háttérében, hogy a sebészek körében nagyobb az öngyilkosságot fontolgatók aránya az átlagnépességhez viszonyítva, miközben segítségért is ritkábban fordulnak. A mintegy 8 ezer amerikai sebész bevonásával készült tanulmányban azt találták, hogy az állásuk elvesztésétől való félelem jelentősen hozzájárul, hogy az érintettek nem kérnek mentális problémáik jelentkezésekor kezelést.

HIRDETÉS

A megkérdezett összes sebész 6 százaléka számolt be öngyilkos gondolatokról, ám azok körében, akik az utóbbi időben valamely komolyabb orvosi hibát követtek el, ez az arány 16 százalék volt. Azt nem lehet egyértelműen tudni, hogy a felmerült öngyilkos gondolatok háttérében az elkövetett hiba állt-e, mert erre irányuló kérdést nem tettek fel.

Azok közül, akik öngyilkosságot fontolgattak, csak minden negyedik sebészorvos keresett professzionális segítséget mentális egészséggel foglalkozó szakembernél. Ezzel szemben az átlagnépesség körében csak 3 százalék azok aránya, akiknél felbukkannak öngyilkos gondolatok, közülük pedig 44 százalék segítséget kér, mentális egészségét támogató kezelést keres.

Mint **Tait Shanafelt** kutatásvezető, a Mayo Klinika munkatársa elmondta, a sebészek arról számoltak be a megkérdezés során, hogy féltik orvosi engedélyüket, tartanak a megbélyegzéstől, és sokan bevallották, hogy öngyógyszerezésbe kezdtek különböző antidepresszánsokkal.

A felmérésben az amerikai sebészek szakmai kollégiumának tagjai elektronikus levélben, anonim módon küldték el válaszaikat a szervezőknek. A tanulmány az Archives of Surgery című szakfolyóirat januári számában jelenik meg.

2011-01-18 11:11

Forrás: MTI

hirdetés